

PREPARAZIONI LABORATORIO:

(N.B. LA PREPARAZIONE DA SEGUIRE E' CONTRADDISTINTA DA UNA X NELLA CASELLA DAVANTI ALLA DESCRIZIONE DELL'ESAME)

ALDOSTERONE E RENINA CLINO E ORTO

All'arrivo il Paziente rimane a riposo per 1 ora (seduto o, meglio, sdraiato) prima di procedere al prelievo per Renina/Aldosterone a riposo (Clino). Quindi fa una passeggiata di circa dieci minuti prima di procedere al prelievo per Renina/Aldosterone dopo moto (Orto).

BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI

Il test non può essere eseguito prima di 4 settimane se il paziente ha eseguito terapia antibatterica con antibiotici, con inibitori di pompa protonica (lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo), oppure se ha completato un ciclo di trattamento con altri farmaci. E non prima di 2 settimane dall'ultima dose di farmaci antisecretori gastrici. Il paziente non dovrà fumare e dovrà venire a digiuno da almeno 6 ore.

BREATH TEST AL LATTOSIO E LATTULOSIO

Il paziente non dovrà assumere da almeno 10 giorni antibiotici, lassativi, fermenti lattici, né dovrà avere una diarrea importante. Il giorno precedente l'esame il paziente dovrà alimentarsi solamente con The, riso bollito condito con olio, carne e pesce lesso ed inoltre non dovrà bere bevande gassate. Il giorno dell'esame il paziente dovrà essere a digiuno da almeno 8 ore senza fumare né usare dentifricio. Durante il test il paziente dovrà rimanere a riposo seduto senza mangiare, bere e fumare.

CYTOTOXIC TEST (ALIMENTARE E ADDITIVI CHIMICI) – PRIME TEST

Il prelievo deve essere effettuato a digiuno, a circa 8-10 ore dal pasto serale; si può bere acqua ma si consiglia di non usare dentifrici la mattina del test. Con l'aiuto del medico sospendere qualsiasi farmaco che contenga cortisone o steroidi (comprese le creme) almeno 48 ore prima del test. Antistaminici ed altre categorie non alterano i risultati. Evitare di fumare o la vicinanza di persone che fumano o qualsiasi esposizione che possa dare una reazione, dalla sera prima. Prendere un nuovo appuntamento per il test in caso di raffreddore, influenza o altre malattie di tipo infiammatorio. Compilare la scheda per il Cytotoxic.

CLAMIDIA URETRALE (UOMO)

- 1) Tale ricerca, sentito il parere del Curante, andrà eseguita preferibilmente sulle prime gocce di urina da raccogliersi in provetta o contenitore sterile: urine I getto (il paziente non deve aver urinato da almeno 3 ore)
- 2) Altrimenti, se richiesto specificatamente il tampone, il prelievo verrà eseguito su apposito tampone a secco previo appuntamento. Il paziente non dovrà aver urinato nelle 2-3 ore precedenti il prelievo.

COPROCOLTURA IN GENERE, PER SALMONELLA E TAMPONE RETTALE PER SALMONELLA

Il tampone deve essere sporco di materiale fecale. Non si accettano se c'è più di 1 giorno di chiusura.